



Solinure® GT

30

Rozwiązanie zapewniające wszechstronny, zdrowy wzrost roślin

20 | 7 | 20 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

Gwarantowana analiza

oxide		
N	Azot całkowity	20%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	5.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	3.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	10.5%
	Azot organiczny	0%
P ₂ O ₅	Pięćotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	7.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	20.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
	Żelazo DTPA (Fe)	0%
	Żelazo EDDHA (Fe)	0%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Opis

Gdy uprawy owoców i warzyw w szklarniach i tunelach znajdują się w trudnej sytuacji, warto sięgnąć po nawóz do fertygacji Solinure® GT 30. Dzięki formule NPK o niskiej zawartości fosforu, wraz z dodatkiem mikroelementów i magnezu, ten przystępny cenowo nawóz jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże roślinom w fazie wzrostu i zapewni im lepszy rozwój korzeni. Wolny od niepożądanego mocznika i chlorków, ten zawsze niezawodny środek zawiera dodatek magnezu i pierwiastków śladowych zapewniających zdrowy wzrost roślin.

Korzyści

- \\ Niezmiennie niezawodny produkt
- \\ Wysokiej jakości surowce z minimalną ilością zanieczyszczeń
- \\ Fantastyczny stosunek jakości do ceny

Charakterystyka

Sposób stosowania

- 1 Solinure® GT 30 należy stosować w fazie reprodukcyjnej i wegetatywnej.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Zadbaj o właściwe uszczelnienie już otwartych lub uszkodzonych worków.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:

Dawka

Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:

40-60 kg/ha na tydzień

Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:

30-50 kg/ha na tydzień

Zalecana dawka: Stosować 3-10 kg/1000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.