



Solinure[®] GT

31

Twoje plony pokażą, że używasz GT

17 | 8 | 27 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	17%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	8.9%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.1%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	8.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	27%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	27.0%
CaO	Tlenek wapnia	3.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	3.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Charakterystyka

Opis

Aby dostarczyć bogate w wapń składniki odżywcze, których potrzebuje system uprawy tunelowej i szklarniowej, wystarczy sięgnąć po nawóz do fertygacji Solinure[®] GT 31. Wysoka zawartość potasu i niska zawartość fosforu w NPK pozwala na wyeliminowanie potencjalnych niedoborów wapnia w uprawach dzięki dodatkowi wapnia, uzupełnionemu o pełny zestaw pierwiastków śladowych. Ta subtelna równowaga ma również na celu pomóc roślinom w pomyślnym ukończeniu etapów reprodukcji. Wolne od niepożądanych chlorków i mocznika, opłacalne rozwiązanie dostarcza tylko tego, czego twoje rośliny rzeczywiście potrzebują.

Korzyści

- Wysoko niezawodny produkt
- Inteligentna koncepcja precyzyjnie dostarcza niezbędne składniki odżywcze
- Dodatek wapnia i pierwiastków śladowych dla kompletnego odżywiania

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Solinure® GT 31 w fazie reprodukcji, szczególnie w przypadku niedoborów wapnia.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:

Dawka

Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:

40-60 kg/ha na tydzień

Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:

30-50 kg/ha na tydzień

Zalecana dawka: Stosować 4-10 kg/1000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.