



Solinure®

4 No Urea

Uwolnij potencjał Urea-I

17 | 6 | 22 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	17%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	9.0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	22%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	22.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.010%
	Miedź EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Żelazo	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.06%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.005%
Zn	Cynk	0.022%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.022%
	Cynk EDTA (Zn)	0.022%

Charakterystyka

Opis

Pomóż swoim owocom i warzywom uprawianym w szklarniach, na polach i w tunelach osiągnąć maksymalny potencjał dzięki nawozowi do fertygacji Solinure® 4 No Urea. Ta w pełni rozpuszczalna w wodzie, wolna od chlorków formuła NPK z obniżonym poziomem mocznika zapewnia doskonałą relację jakości do ceny, dając roślinom to, czego potrzebują, aby osiągnąć nowy poziom. Gwarantuje zdrowy wzrost i wysoką wydajność dzięki pełnemu zestawowi pierwiastków śladowych i dodatkowi magnezu.

Korzyści

- \\ Opracowany dla etapu wzrostu owoców
- \\ Formuła bez chlorków z niskim poziomem mocznika
- \\ Idealne rozwiązanie dla szklarni lub systemu tunelowego

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Solinure® 4 No Urea, aby zapewnić wzrost owoców i warzyw.
- 2 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 3 Przechowywać w suchych warunkach.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Dawka: 40-60 kg/ha na tydzień.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

