



7 High N

High-N daje roślinom moc

24 | 12 | 12 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	24%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	4.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	18.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	12.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.002%
	Miedź EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Żelazo	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.04%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.002%
Zn	Cynk	0.002%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.002%
	Cynk EDTA (Zn)	0.002%

Charakterystyka

Opis

Jeśli oczekujesz wzrostu upraw owoców i warzyw w tunelach, na polach i w szklarniach, postaw na wysoką zawartość azotu w wysokiej jakości nawozie do fertygacji Solinure® 7 High N. Ta kompleksowa formuła NPK z dodatkiem magnezu, oraz pełnym zestawem mikroelementów dla lepszej wydajności roślin, jest dostosowana do specyficznych potrzeb odżywiania roślin. Dlatego właśnie jest to opłacalne rozwiązanie, które zapewnia duży wzrost i wyniki.

Korzyści

- \\ Całkowicie wolny od chlorków
- \\ Nadaje się do pobudzenia wzrostu wegetatywnego
- \\ Dodatkowy magnez i zestaw pierwiastków śladowych

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Solinure® 7 High N, aby pobudzić wzrost roślin w fazie wegetatywnej.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Zadbaj o właściwe uszczelnienie już otwartych lub uszkodzonych worków.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Dawka: 40-60 kg/ha na tydzień.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

