



Micromax[®]

Fe

Szybko działająca odżywka do walki z niedoborami FE

0 | 0 | 0 | TE

N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	0%
P2O5	Pięcioletek fosforu	0%
K2O	Tlenek potasu	0%
Fe	Żelazo	7.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	7.0%
	Żelazo EDDHA (Fe)	7.0%

Charakterystyka

Opis

Jeśli Twoim roślinom doskwiera niedobór żelaza, wystarczy sięgnąć po Micromax[®] WS Fe, a w ciągu kilku dni wrócą do pełni sił. Ten najwyższej jakości nawóz jest w pełni rozpuszczalny w wodzie i łatwy do przygotowania. Zawiera zarówno żelazo schelatowane EDDHA, jak i X3 — specyficzny biostymulant, który pomaga roślinom jak najszybciej i najskuteczniej wchłonąć je do liści. Można go stosować w wielu różnych uprawach i świetnie sprawdza się w mieszankach zbiornikowych.

Korzyści

- \\ Szybko eliminuje wszelkie niedobory żelaza
- \\ W 100% rozpuszczalny w wodzie: szybki i łatwy w przygotowaniu
- \\ Biostymulant zapewniający szybsze wchłanianie

Sposób stosowania

- 1 Micromax® może powodować przebarwienia na roślinie.
- 2 Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym, wentylowanym miejscu.
- 3 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecane dawki

Kwiaty i warzywa	Fertygacja: 3-5 kg/ha, począwszy od pierwszych oznak chlorozy Fe.
	Aplikacja dolistna: 0,2-0,3%, począwszy od pierwszych objawów chlorozy Fe; zastosować 2 dodatkowe opryski w odstępach 10 – 15 dniowych.
Owoce wysokie i miękkie	Fertygacja: 5-7 kg/ha, począwszy od pierwszych oznak chlorozy Fe.
	Aplikacja dolistna: 0,2-0,3%, począwszy od zawiązania owoców; obserwować objawy niedoboru Fe i natychmiast reagować stosując 2 – 3 dodatkowe opryski w odstępach 10 – 15 dniowych.
Uprawy rolne	Aplikacja dolistna: 0,3-0,4%, począwszy od pierwszych objawów chlorozy Fe; zastosować 2 dodatkowe opryski w odstępach 10 – 15 dniowych..

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.