



**Agroleaf[®]
Liquid**

Man Z+

Niedobory manganu i cynku uzupełniane jednocześnie

0 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	0%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	0%
	Azot organiczny	0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	0%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	0%
K2O	Tlenek potasu	0%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	0%
Mn	Mangan	4.70%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	4.70%
	Mangan EDTA (Mn)	4.70%
Zn	Cynk	1.300%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	1.300%
	Cynk EDTA (Zn)	1.300%

Charakterystyka

Opis

Dwa niedobory składników odżywczych skorygowane jednym rozwiązaniem: Agroleaf[®] Liquid Man Z+. Zawiera mikroelementy manganu i cynku w postaci chelatowej, opracowane do stosowania w formie oprysków dolistnych i/lub fertygacji, zarówno dla roślin uprawnych, jak i drzew owocowych. Man Z+ może być stosowany w celu zapobiegania lub eliminowania niedoborów manganu i cynku, zawiera więcej manganu niż jego siostrzany produkt Agroleaf[®] Liquid Zinc M+. Stosować zapobiegawczo jako oprysk dolistny roślin uprawnych. Najlepiej stosować Man Z+ w okresie największego wzrostu wegetatywnego. Dla drzew owocowych zaleca się stosowanie w okresie inicjacji i rozwoju głównych pęknięć, unikając pełni kwitnienia. Do aplikacji zapobiegawczej zaleca się stosowanie Man Z+ przez fertygację.

Korzyści

- \\ Dwa w jednym: koryguje i zapobiega niedoborom manganu i cynku
- \\ Więcej manganu niż Agroleaf[®] Liquid Zinc M+
- \\ Nadaje się zarówno do upraw rolnych, jak i do drzew owocowych

Sposób stosowania

- 1 Ogólnie: Wykonać 2-3 zabiegi zapobiegawcze dla roślin uprawnych w okresie największego wzrostu wegetatywnego, a w przypadku drzew z początkiem i podczas rozwoju głównych pędów, unikając okresów pełni kwitnienia.
- 2 Rozcieńczać w dawce 200-350 cm³/hl nie przekraczając 8 l/ha na jedno zastosowanie. Zastosować maksymalną dawkę w przypadku stwierdzenia niedoborów.
- 3 Zastosować środek zwilżający.
- 4 Oprysk dolistny owoców cytrusowych: Szczególnie w przypadku upraw cytrusów pierwszą dawkę stosować wiosną po pojawieniu się nowych pędów, gdy dostatecznie rozwinięte nowe liście osiągną 2/3 naturalnej wielkości. Ponownie zastosować w ciągu 15 dni, a następnie w okresie letniego kwitnienia.
- 5 W przypadku zastosowań o łącznym zużyciu mniejszym niż 2000 l/ha należy stosować większe dawki (350 cm³/hl); w przypadku większych objętości (maksymalnie do 3000 l/ha) należy stosować połowę dawki (250 cm³/hl).
- 6 Oprysk dolistny na owoce pestkowe i pestki: Środek stosować w okresie największego wzrostu wegetatywnego, gdy roślina uprawna ma wystarczającą masę liściową. Zalecana dawka wynosi 150-250 cm³/hl przy maksymalnym wykorzystaniu 1000 l/ha.
- 7 Warzywa: Zalecana dawka wynosi 150-200 cm³/hl przy maksymalnym wykorzystaniu od 800 do 1000 l/ha.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.