



Agroleaf® Liquid

High P

Concentrație sporită de fosfor pentru culturi fericite și productive

5 | 25 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	5%
	Azot (N-NH ₄)	5%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	25%
	Solubil (P ₂ O ₅)	25%
K ₂ O	Oxid de potasiu	5%
	Solubil (K ₂ O)	5%
B	Bor	0.02%
	Solubil	0.02%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.060%
	Solubil	0.060%
	Fier chelat de EDDHA	0.06%
Mn	Mangan	0.030%
	Solubil (Mn)	0.030%
	Mangan chelat de EDTA	0.030%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.015%
	Solubil	0.015%
	Zinc chelat de EDTA	0.015%

Descriere

Agroleaf® Liquid High P este un îngrășământ foliar lichid NPK de înaltă calitate, dar cu o cantitate enormă de pentoxid de fosfor de 25%, menținând deficiența de fosfor la distanță. Produsul este îmbogățit cu un pachet consistent de oligoelemente chelate. În spatele Agroleaf Liquid High P se află tehnologia F3 SurfActive de la ICL, dezvoltată pentru a îmbunătăți eficiența la fiecare aplicație foliară. Culturile dumneavoastră se bucură de o mai bună răspândire, adezivitate, și de retenție. F3 scade tensiunea superficială a picăturilor, împrăștiind nutrienții mai uniform peste frunze. Rezultatul: o acoperire mai largă și o absorbție îmbunătățită a nutrienților. Se păstrează mai mulți nutrienți, împiedicându-i să se scurgă sau să ricoșeze de pe frunzele cerate. Tehnologia F3 ajută, de asemenea, substanțele nutritive să formeze depuneri mici pe suprafața frunzei, care sunt reactivate după reumidificare. Cu evaporarea împiedicată, nutrienții sunt păstrați mai mult timp, îmbunătățind aplicarea foliară.

Beneficii

- \\ Ambalate cu fosfor pentru a preveni sau corecta orice deficiență
- \\ De asemenea, conține oligoelemente chelate
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

- 1 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Fruiting vegetables, general	3-6	300-600	1	1 săptămână după plantare, înainte și după înflorire, de 2-3 ori
Căpșuni, legume cu frunze, conopida broccoli	3-6	300-600	1	După plantare de 1-2 ori
Ceapa, usturoi	3-6	300-600	1	La 2-3 frunze, de 1-2 ori
Fructe perisabile, livezi, podgorii	3-6	600-1000	0.5-0.6	Înainte de înflorire și cu 2 săptămâni înainte de recoltare, de 1-2 ori
Cartof	3-6	250-300	1.2-2	Înainte de inițierea tuberculilor, de 1-2 ori
Porumb	3-6	200-300	1.5-2	La 4-6 frunze, de 1-2 ori
Rapiță	3-6	200-300	1.5-2	Toamna sau primăvara devreme
Culturi ornamentale	2-3	600-1000	0.3	1 săptămână după replantare sau germinare și înainte de înflorire, de 1-2 ori

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.