



Agroleaf[®] Liquid

Magnesium

Hrană lichidă pentru culturile deficiente de magneziu

7 | 0 | 0 | 10
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	7%
	Azot (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	0%
MgO	Oxid de magneziu	10%
	Solubil	10.0%

Descriere

Conceput având în vedere hrănirea cu magneziu, Agroleaf Liquid Magnesium este un îngrășământ foliar lichid de înaltă calitate, formulat pentru utilizare la toate tipurile de culturi. Agroleaf[®] Liquid Magnesium conține tehnologia unică F3 SurfActive, dezvoltată de ICL, care crește eficiența fiecărei aplicații foliare în trei moduri, oferind o mai bună răspândire, adezivitate și retenție. Tehnologia F3 scade tensiunea superficială a picăturilor. Nutrienții pot fi apoi mai bine răspândiți pe frunze, rezultând o zonă acoperită mai mare și o mai bună absorbție a nutrienților. Mai puțini nutrienți se vor scurge sau vor ricoșa de pe frunzele cerate, oferind o mai bună retenție a nutrienților. Iar tehnologia F3 ajută, de asemenea, la formarea unor mici depozite de nutrienți pe suprafața frunzei, care sunt reactivate după reumidificare, prevenind evaporarea și oferind o nutriție prelungită pentru o aplicare foliară îmbunătățită.

Beneficii

- \\ Perfect pentru corectarea și prevenirea deficitului de magneziu
- \\ Potrivit pentru o gamă largă de culturi
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

1

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume în general	3-6	300-600	1	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 4-5 ori
Cartof	3-6	250-300	1.2-2	După înflorire, de 2-3 ori
Onion, Garlic	3-6	300-600	1	După 5-6 frunze, de 2-3 ori
Fructe moi, Livezi, Podgorii	3-6	600-1000	0.5-0.6	Din setarea fructelor – recoltare, de 3-4 ori
Cereale	3-6	200-300	1.5-2	Al 2-lea internod – frunză lanceolată
Porumb	3-6	200-300	1.5-2	La 8-10 frunze
Rapiță	3-6	200-300	1.5-2	Primăvara până la înflorire

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.