



Agroleaf[®] Liquid

Moly B

Îngrășământ lichid premium cu bor și molibden

4 | 16 | 4
N P2O5 K2O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	4%
	Azot (N-NH ₄)	2.6%
	Azot ureic (N-Urea)	1.4%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	16%
	Solubil (P2O5)	16%
K2O	Oxid de potasiu	4%
	Solubil (K2O)	4%
B	Bor	0.1%
	Solubil	0.1%
Mo	Molibden	2.00%
	Solubil	2.00%

Descriere

Agroleaf Liquid Moly B este un îngrășământ foliar lichid de înaltă calitate cu NPK, îmbogățit cu bor și cu o concentrație înaltă de molibden. Acesta a fost dezvoltat pentru culturile cu cerere mare de bor și molibden, oferind o soluție rapidă pentru a corecta orice deficiențe ale acestora. Secretul din spatele Agroleaf Liquid Moly B este tehnologia F3 SurfActive, dezvoltată pe loc la ICL pentru a face fiecare aplicație foliară mai eficientă. Culturile dumneavoastră beneficiază de o mai bună răspândire, adezivitate și retenție. Reduce tensiunea superficială a picăturilor, astfel încât nutrienții sunt distribuiți mai uniform pe frunze, oferind o acoperire mai mare și o mai bună absorbție a nutrienților. Tehnologia funcționează în așa mod ca să păstreze mai mulți nutrienți, împiedicându-i să se scurgă sau să ricoșeze de pe frunzele cerate. F3 ajută, de asemenea, substanțele nutritive să formeze depozite mici pe suprafața frunzelor, care sunt reactivate după reumidificare pentru a preveni evaporarea. Nutrienții se lipesc apoi pentru mai mult timp, îmbunătățind aplicarea foliară.

Beneficii

- Regrează deficiența de bor și molibden
- Potrivit pentru o gamă largă de culturi
- O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

1

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume fructifere, cartof	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, Pentru culturile cultivate în câmp deschis, după închiderea rândului
Leguminoase, soia	1-2	300	0.3-0.7	La 6 frunze
Varză, conopidă, broccoli	1-3	300-600	0.3-0.5	De la 6-8 frunze, de 2-3 ori
Rapiță	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Toamna, primăvara până la înflorire, de 2 ori
Floarea soarelui	1-3	200-300	0.5-1	At 4-6 leaves
Sfeclă de zahăr	1-3	250-400	0.4-0.8	La 6-8 frunze
Pășune	0.5-1	200-300	0.25-0.3	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 2-3 ori

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.