



Agroleaf® Liquid

Iron

Iron out iron deficiency in your crops

O | O | O | TE
N P2O5 K2O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	0%
Fe	Fier	4.400%
	Solubil	4.400%
	Fier chelat de EDTA	4.400%

Descriere

Agroleaf® Liquid Iron is a premium foliar feed in liquid form that keeps iron deficiency at bay. It has been formulated for use in crops of all kinds, especially soft fruits. Agroleaf® Liquid Iron features ICL's unrivalled F3 SurfActive technology, which we designed specifically to make each foliar application more efficient. It does this in three ways: by improving spreading, adhesiveness, and retention. F3 technology reduces the surface tension of the droplets, allowing nutrients to distribute over the leaves more evenly for greater coverage and better nutrient uptake. It also retains more nutrients, preventing them from running or bouncing off waxy leaves. F3 aids nutrients in the formation of small deposits on the leaf surface, which are re-activated after rewetting. This prevents evaporation, which means the nutrients linger for longer, improving foliar application.

Beneficii

- \\ Păstrează plantele hrănite cu fierul de care au nevoie
- \\ Excelent pentru o gamă largă de culturi, în special fructe moi
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

- 1 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume fructifere	3-6	300-600	1	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori
Căpșun	3-6	250-400	1.2-1.5	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori
Afin	3-6	250-400	1.2-1.5	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori
Other soft fruits	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori pentru aplicații curative
Livezi	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori pentru aplicații curative
Podgorii	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori pentru aplicații curative
Culturi ornamentale	2-3	600-1000	0.3	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.