



Agromaster®

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃

Mențineți-vă câmpurile deschise la randamente înalte

12 | 5 | 20 | 2 | 4.0 | 35
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO | SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot (N-NO ₃)	1.4%
	Azot (N-NH ₄)	5.7%
	Azot ureic (N-Urea)	4.9%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Oxid de potasiu	20%
	Solubil (K ₂ O)	20%
CaO	Oxid de calciu	2%
	Solubil	2%
MgO	Oxid de magneziu	4.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	35%

Descriere

Oferiți fructelor și legumelor cultivate în câmp deschis sau în zone protejate un impuls plin de nutrienți cu Agromaster 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃ | 2-3M. Această formulă NPK cu conținut ridicat de potasiu, cu adaos de calciu, magneziu și sulf este completată cu 41% acoperire cu N cu tehnologia de E-Max Release a ICL. Acest lucru vă permite să vă protejați plantele cu ciclu de cultură mediu-lung de pierderile de azot chiar și în cele mai dure condiții meteorologice și de creștere.

Beneficii

- Formula NPK cu conținut ridicat de potasiu pentru randamente crescute
- Calciu adăugat pentru îmbunătățirea calității și transportul nutrienților
- Magneziu cu concentrații înalte pentru o fotosinteză îmbunătățită

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin imprastiere, în rând sau direct în jurul plantei.
- 2 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 3 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 4 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigare după aplicare.
- 5 Reduceți doza dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Legume cultivate în arii protejate sau câmpuri deschise	
Roșii, ardei și vinete	400-800 kg/ha
Castraveți, dovlecei, pepeni galbeni și pepeni verzi	400-800 kg/ha
Ceapă și usturoi	400-800 kg/ha
Morcovi și alte legume rădăcinoase	400-800 kg/ha
Salată	400-800 kg/ha
Fructe perisabile cultivate în sol	
Căpșun	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.