



ProTurf®

12-5-20+2CaO+2MgO

Pentru un gazon ca de oțel

12 | 5 | 20 | 2.0 | 2.0
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot (N-NH4)	1.3%
	Azot ureic (N-Urea)	10.7%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P2O5)	3.7%
K2O	Oxid de potasiu	20%
	Solubil (K2O)	20.0%
CaO	Oxid de calciu	2.0%
	Solubil	2.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%

Descriere

Dacă doriți să vă fortificați gazonul obosit și problematic, aveți la dispoziție ProTurf® 12-5-20+2CaO+2MgO. Combinând tehnologiile de eliberare controlată și de îngrășământ complex, acest mini-îngrășământ bogat în polihalit vă va fortifica gazonul. Acest lucru se datorează nivelurilor sale ridicate de magneziu, potasiu, sulf și calciu, toate sub o peliculă pe bază de azot. Ajutați-vă gazonul să facă față condițiilor dure din mijlocul verii sau al toamnei, indiferent de timp – ploios sau însorit.

Beneficii

- Doză flexibilă fără efectul de „pete de leopard” în gazon
- Creștere controlată a gazonului și efect rapid de intensificare a culorii
- Foarte solubil, curat și inodor pentru o influență minimă asupra jocului

Mod de utilizare

- 1 Se aplică direct pe frunzișul uscat.
- 2 Udarea după aplicare facilitează dispersia și amplifică efectul imediat.
- 3 A nu se aplica în perioade de secetă sau îngheț.
- 4 Pentru a reduce riscul de imprimare a urmelor de pași pe gazon, udați după aplicare.
- 5 Aplicați după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, creștere și/sau carotaj pentru a evita deteriorarea granulelor.
- 6 A se depozita în condiții uscate.
- 7 Sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate
- 8 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Intervalul dozelor recomandate: 20,00 - 35,00 g/m² Doza recomandată medie: 27,5 g/m² Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.