



Greenmaster® Liquid

Spring & Summer

O primăvară și o vară de dragoste pentru gazonul dumneavoastră

12 | 4 | 6 | TE
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot ureic (N-Urea)	11.2%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	4%
	Solubil (P ₂ O ₅)	4.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	6%
	Solubil (K ₂ O)	6.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.004%
	Solubil	0.004%
	Cupru chelat de EDTA	0.004%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.001%
	Solubil	0.001%
Zn	Zinc	0.004%
	Solubil	0.004%
	Zinc chelat de EDTA	0.004%

Descriere

Ideal pentru perioadele principale de creștere – Greenmaster® Liquid Spring & Summer are o formulă NPK completă pentru hrănire fără creștere în exces timp de până la 6 săptămâni după aplicare. Spring & Summer completează, de asemenea, nutrienții pierduți în urma tăierii gazonului, accentuează culoarea gazonului și îl menține sănătos. Un pachet complet de oligoelemente menține sănătatea generală a gazonului și ajută la depășirea stresului.

Beneficii

- \\ Pentru fertilizare în sezonul principal de creștere, fără creștere în exces
- \\ Reface nutrienții și îmbunătățește recuperarea în urma stresului

Mod de utilizare

- 1 Se aplică din aprilie până în septembrie.
- 2 Evitați aplicarea la temperaturi ridicate și în condiții însoțite pentru a optimiza absorbția foliară.
- 3 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 4 Produsele Greenmaster® Liquid pot fi amestecate în rezervor cu alte produse din gamă, pentru compatibilitate, verificați tabelul cu amestecuri de rezervor.
- 5 Amestecați cu indicatorul de tipare de pulverizare Colour Pro pentru a susține pulverizarea și a reduce la minimum imprecizia pulverizării.
- 6 Volumul de apă utilizat pentru aplicarea produselor Greenmaster® Liquid va influența modul în care sunt absorbiți nutrienții de către plantă.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Doză recomandată:

40-120 l/ha

Doză medie recomandată:

80 l/ha

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.