



Agroblen®

18-5-10+2MgO

Căpșunile dumneavoastră merită tot ce-i mai bun

18 | 5 | 10 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	18%
	Azot (N-NO3)	7.6%
	Azot (N-NH4)	8.4%
	Azot ureic (N-Urea)	2.0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P2O5)	3.7%
K2O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K2O)	10.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%

Descriere

Cultivați căpșuni de înaltă calitate și alte culturi de fructe moi cu Agroblen 18-5-10+2MgO | 2-3M. Acest îngrășământ NPK cu un conținut ridicat de azot cu adaos de magneziu a fost special conceput pentru a obține cele mai bune rezultate din căpșunile dvs. cultivate în sol, în special atunci când sunt stabilite de plantule „frigo”. Prin aplicarea pe rânduri, puteți asigura o fertilizare eficientă și o stabilire rapidă a culturii dumneavoastră. Bucurați-vă de cea mai fructuoasă recoltă de până acum datorită eliberării controlate de nutrienți a tehnologiei patentate de eliberare a rășinii de la ICL.

Beneficii

- Analiza minuțioasă a azotului pentru a promova o creștere uniformă
- Magneziu suplimentar pentru fotosinteză îmbunătățită
- O singură aplicare pentru nutriție pe întreg ciclul scurt al culturii
- Reducerea levigării cauzate de precipitații sau irigații

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe rânduri sau prin difuzare.
- 2 Nu se aplică mai târziu de 1-2 săptămâni înainte de plantare.
- 3 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 4 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 5 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 6 Reduceți doza aplicată dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 7 A se păstra în condiții uscate.
- 8 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 9 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.



Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Căpșuni - culturi cultivate pe sol în câmp deschis:	12-15 g/plantă (la 30.000 pl/ha)
Culturi cultivate pe sol în câmp deschis (în paturi):	3-4 g/plantă (la 100.000 pl/ha)
Alte fructe moi - aplicarea pe rânduri:	300-450 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.