



Agroblen®

18-5-11+2MgO

Oferiți-le culturilor dvs. tot ce-i mai bun

18 | 5 | 11 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	18%
	Azot (N-NO ₃)	7.5%
	Azot (N-NH ₄)	8.4%
	Azot ureic (N-Urea)	2.1%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P2O5)	3.7%
K2O	Oxid de potasiu	11%
	Solubil (K2O)	11.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%

Descriere

Culegeți roadele muncii dvs. cu Agroblen® 18-5-11+2MgO | 3-4M, îngrășământul cu eliberare controlată special conceput pentru nevoile nutriționale ale culturilor de căpșuni și fructe moi. Formula NPK complet acoperită cu un conținut înalt de azot a acestui produs cu adaos de magneziu asigură o creștere rapidă și o stabilire eficientă a culturilor, chiar și la culturile mai extinse de fructe și legume. După o singură aplicare simplă pe rânduri, puteți să vă puteți bucura de 3-4 luni de nutriție controlată pentru plantele dvs. datorită tehnologiei brevetate de eliberare a rășinii de la ICL.

Beneficii

- \\ Bogat în azot pentru o creștere uniformă
- \\ Reducerea levigării nutrienților în timpul irigației sau precipitațiilor
- \\ Conceput special pentru cultura de căpșuni

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe rânduri sau prin difuzare.
- 2 Nu se aplică mai târziu de 1-2 săptămâni înainte de plantare.
- 3 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 4 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 5 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 6 Reduceți doza aplicată dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 7 A se păstra în condiții uscate.
- 8 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 9 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.



Doze de aplicare

Culturi:	Rată
----------	------

Căpșuni:	12-15 g/plantă pentru culturile cultivate pe sol în câmp deschis (la 30.000 pl/ha)
----------	--

Căpșuni:	3-4 g/plantă pentru culturi cultivate pe sol în câmp deschis, în paturi (la 100.000 pl/ha)
----------	--

Alte fructe moi:	300-450 kg/ha, row application
------------------	--------------------------------

Alte culturi potrivite: 300-600 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.