



Agromaster®

15-7-15+3MgO+34SO₃

Un amestec echilibrat pentru multe culturi

15 | 7 | 15 | 3.0 | 34.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot (N-NH ₄)	8.0%
	Azot ureic (N-Urea)	7.0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	7%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	15%
	Solubil (K ₂ O)	15.0%
MgO	Oxid de magneziu	3.0%
	Solubil	3.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	34.0%
	Solubil	34.0%

Descriere

Agromaster 15-7-15+3MgO+34SO₃ | 2-3M poate aborda orice condiții care i-ar putea veni în cale. Dispune de un amestec de azot cu eliberare controlată cu granule de îngrășăminte convenționale alese cu grijă. Această formulă are un raport NPK util de 2-1-2, echilibrând azotul și potasiul pentru o creștere uniformă, plus că oferă magneziu pentru a stimula fotosinteza și o mare concentrație de sulf pentru a ajuta la dezvoltarea și îmbunătățirea absorbției azotului. 30% azot acoperit înseamnă că nutrienții sunt eliberați eficient timp de până la 3 luni, atunci când plantele au cea mai mare nevoie de el.

Acest îngrășământ eficient respectă mediul înconjurător, iar tehnologia noastră specială E-Max Release înseamnă că se va pierde mai puțin azot prin leșiere, volatilizare sau denitrificare. Este ușor de utilizat și este formula perfectă pentru randamente mai mari cu culturi precum legume cu frunze, cum ar fi: legume frunzoase, sau livezi mature sau viță de vie.

Beneficii

- \\ Echilibrul de azot și potasiu, plus magneziu și sulf
- \\ Randament mai mare datorită nutriției continue și pierderii minime de azot
- \\ Combinație de nutrienți disponibili direct și eliberare controlată tehnologic

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin difuzare, per rând sau aplicare direct în patul plantei.
- 2 Încorporați Agromaster® în sol între 5-10 cm adâncime.
- 3 Dacă este cazul, produsul se pune sub picurare.
- 4 Irigarea după aplicare îmbunătățește performanța produsului și a plantelor.
- 5 Dacă utilizați WSF-uri în a doua parte a ciclului de cultură, reduceți doza de Agromaster® în consecință.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Plantații mature	
Podgorii și livezi	400-800 kg/ha
Legume cu frunze	
Spanac și legume frunzoare	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.