



Agromaster®

16-8-16+5MgO+16SO₃

Luni de nutriție în toate condițiile

16 | 8 | 16 | 5.0 | 16.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	16%
	Azot (N-NO ₃)	1.2%
	Azot (N-NH ₄)	3.0%
	Azot ureic (N-Urea)	11.8%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	8%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	16%
	Solubil (K ₂ O)	16.0%
MgO	Oxid de magneziu	5.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	16.0%

Descriere

Agromaster® 16-8-16+5MgO+16SO₃ | 5-6M este formulat în special pentru ciclurile de cultură medii-lungi, deoarece conținutul său foarte ridicat de granule acoperite de înaltă tehnologie își eliberează nutrienții pe parcursul a 5 - 6 luni, la temperatura medie a solului de 21°C. Rămâne doar alegerea pentru plasarea în locaș sau aplicarea pe rânduri sau paturi, cu culturi cum ar fi castraveți, roșii, ardei sau vinete, fie sub o acoperire, fie în câmpuri deschise mediteraneene sau subtropicale. Are un raport echilibrat între azot și potasiu, astfel încât plantele dvs. vor crește constant și uniform, plus are o cantitate foarte mare de magneziu pentru o fotosinteză mai bună și sulf pentru o absorbție îmbunătățită a azotului. Tehnologiile noastre combinate E-Max și Resin Release înseamnă eliberare super-eficientă de nutrienți și pierderi minime, astfel încât plantele dvs. beneficiază mai mult. Pregătiți-vă să fiți surprinși de randamentul culturilor cu Agromaster®.

Beneficii

- \\ Raport NK echilibrat plus magneziu și sulf pentru o creștere continuă
- \\ Randament mai mare, sau utilizarea de mai puțin cu menținerea randamentului obișnuit
- \\ Eliberare controlată pe termen lung pentru cicluri de culturi mai lungi

Mod de utilizare

- 1 Aplicați în locașuri, paturi sau prin aplicarea pe rânduri.
- 2 Încorporați Agromaster® în sol între 5-10cm adâncime.
- 3 Dacă este cazul, produsul se pune sub picurare.
- 4 Irigarea după aplicare îmbunătățește performanța produsului și a plantelor.
- 5 A se păstra în condiții uscate.
- 6 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 7 Dacă utilizați WSF-uri în a doua parte a ciclului de cultură, reduceți doza de Agromaster® în consecință.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Cicluri medii de cultură a legumelor cultivate în arii protejate: Roșii, piper, vinete, castraveți	400-800 kg/ha
Fructe și legume cultivate în câmp deschis	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.