



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Contented crops whatever the weather

19 | 5 | 20 | 4.0 | 19.5
N | P₂O₅ | K₂O | MgO | SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	19%
	Azot (N-NH ₄)	1.4%
	Azot ureic (N-Urea)	17.6%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	20%
	Solubil (K ₂ O)	20.0%
MgO	Oxid de magneziu	4.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	19.5%

Descriere

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO₃ | 2-3M conține mult azot și potasiu, astfel încât legumele și fructele dvs. să crească uniform. Este ideal pentru culturile din câmpuri deschise sau zone protejate sau plante din pepiniere cultivate pe câmp. De asemenea, se vor bucura de un plus de magneziu pentru a-și stimula fotosinteza și de sulf pentru a putea absorbi azotul mai eficient. Cu 35% azot acoperit cu tehnologia noastră E-Max Release de ultimă oră pentru o eliberare treptată în timp de 2 – 3 luni, plus un amestec de îngrășământ convențional, plantele dumneavoastră vor produce mai mult la aceleași doze de aplicare. Există, de asemenea, mai puțină risipă: orice scurgere de azot, volatilizare și denitrificare este menținută la un nivel minim, astfel încât mai mult ajunge la culturile dvs.

Beneficii

- \\ NK înalt pentru o creștere uniformă, plus magneziu și sulf
- \\ Randament mai mare, sau utilizarea de mai puțin cu menținerea randamentului obișnuit
- \\ Amestec de nutrienți imediați și eliberare controlată tehnologic

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin difuzare, per rând sau aplicare direct în patul plantei.
- 2 Încorporați Agromaster® în sol între 5-10 cm adâncime.
- 3 Dacă este cazul, produsul se pune sub picurare.
- 4 Irigarea după aplicare îmbunătățește performanța produsului și a plantelor.
- 5 Dacă utilizați WSF-uri în a doua parte a ciclului de cultură, reduceți doza de Agromaster® în consecință.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Pepiniere cultivate în câmp	400-800 kg/ha
Fructe și legume cultivate în arii protejate și în câmp deschis	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.