



Topdress FT 4-5M

Soluție de top pentru toate aplicările de suprafață de care aveți nevoie

22 | 5 | 6 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	22%
	Azot (N-NO ₃)	4.8%
	Azot (N-NH ₄)	5.9%
	Azot ureic (N-Urea)	11.3%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	6%
	Solubil (K ₂ O)	6.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	1.0%
Cu	Cupru	0.050%
Fe	Fier	0.80%
Mn	Mangan	0.30%
Zn	Zinc	0.100%

Descriere

Osmocote® Topdress FT 4-5M a fost conceput cu gândul la culturile dumneavoastră de pepinieră la container. Este gândit să acopere necesarul dumneavoastră complet de aplicări de suprafață. Include tehnologia de fuziune specială pentru a se asigura că aderă ușor la substratul dumneavoastră de cultivare. Așadar, în cazul în care containerele se răstoarnă, granulele nu se vor pierde.

Beneficii

- \\ Bogat în azot și fosfor cu eliberare rapidă și lentă
- \\ Asigură distribuția uniformă datorită granulelor de dimensiuni mici
- \\ Conține oligoelemente suplimentare pentru un efect optim de intensificare a culorii verzi

Mod de utilizare

- 1 Pentru materialul săditor sensibil, reduceți aceste doze recomandate.
- 2 Aplicați produsul doar la suprafața solului. În cazul irigații prin picurare, amplasați produsul sub furtunul de picurare.
- 3 Produsul nu este destinat amestecării sau introducerii în substrat.
- 4 Produsele cu aplicare la suprafață nu pot fi utilizate cu sisteme de irigare capilare sau sisteme de irigare de tip flux/reflux.
- 5 A se depozita în condiții uscate.
- 6 Sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.

Doze de aplicare

	Containere < 10 litri	Containere > 10 litri
Culturi de pepinieră la container	2 – 4 g/l	pentru fiecare litru de conținut suplimentar*

*Exemplu: Doza totală în cazul utilizării unui container de 50 de litri: 3 g/l pentru primii 10 litri = 30 grame 1 g/l pentru următorii 40 litri = 40 grame Total = 30 + 40 = 70 grame per container de 50 litri Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.