



Osmocote® Bloom

Bloom 2-3M

Opțiunea ecologică pentru plante cu flori pentru straturi și paturi de cultură

13 | 7 | 18 | 20.7 | TE
N P₂O₅ K₂O SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	13%
	Azot (N-NO ₃)	5.2%
	Azot (N-NH ₄)	6.9%
	Ureaformaldehide (N-MU)	0.9%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	7%
	Solubil (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	18%
	Solubil (K ₂ O)	18.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	20.7%
B	Bor	0.018%
	Solubil	0.016%
Cu	Cupru	0.052%
	Solubil	0.052%
Fe	Fier	0.35%
	Fier chelat de EDTA	0.07%
Mn	Mangan	0.050%
Mo	Molibden	0.017%
	Solubil	0.012%
Zn	Zinc	0.021%

Descriere

Ajutați-vă plantele pentru straturi să își atingă întregul potențial cu îngrășământul peliculat cu eliberare controlată Osmocote® Bloom, care are un efect garantat asupra plantelor anuale în ghivece mici, datorită formulei sale ajustate special. Alegând un îngrășământ care necesită aplicări în cantități mai mici, faceți o alegere ecologică, sigură, fiabilă și beneficiați de un raport calitate-preț excelent.

Beneficii

- \\ Raport NPK ideal de 2:1:3 pentru cultivarea plantelor în straturi dese
- \\ Utilizați produsul direct din cutie, nu este nevoie să adăugați îngrășământ solubil în apă
- \\ Prolungește durata de viață a plantelor pentru straturi în faza de comercializare și la beneficiarul final

Mod de utilizare

- 1 Când vine vorba de plantele dumneavoastră pentru straturi, Osmocote® Bloom are un model de eliberare foarte regulat datorită tehnologiei unice de peliculare cu rășină a ICL Specialty Fertilizers.
- 2 Utilizați Osmocote® Bloom la cultivarea plantelor de înălțime mică pentru straturi, de la 6 săptămâni la 3 luni.
- 3 Pentru celelalte tipuri de plante pentru straturi, utilizați Osmocote® Exact Standard High K 3-4M sau 5-6M.
- 4 Nu depozitați la temperaturi care depășesc 21°C, deoarece acestea vor afecta negativ longevitatea Osmocote® Bloom. 16°C: 3-4M 21°C: 2-3M 26°C: 1,5-2M.
- 5 Asigurați-vă că sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 6 A se depozita în condiții uscate.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

	Administrare redusă	Administrare normală	Administrare intensă
Plante / Anuale	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4,5 g/l

Atenție Aceste doze recomandate se bazează pe substraturi nefertilizate. Rezultatele optime pot fi atinse dacă pământul pentru ghiveci nu conține îngrășământ starter. Totuși, în cazul în care se utilizează un îngrășământ starter, vă recomandăm să nu utilizați mai mult de 0,5 kg/m³ în combinație cu dozele de aplicare menționate mai sus. Osmocote® Bloom este conceput în special pentru a fi amestecat în mediul de cultivare - nu recomandăm aplicarea acestui produs cu plantatorul. Refertilizarea cu produse solubile în apă și/sau ajustările pentru calitatea apei pot fi necesare în anumite circumstanțe. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru orice rezultate negative.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.