



Sierraform[®] GT

Momentum

Oferiți-i gazonului extra Momentum

22 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	22%
	Azot (N-NH ₄)	2.9%
	Azot ureic (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5.0%
	Solubil (P2O5)	4.0%
K2O	Oxid de potasiu	11.0%
	Solubil (K2O)	11.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
Cu	Cupru	0.02%
Fe	Fier	0.5%
Mn	Mangan	0.100%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Zinc	0.020%

Descriere

Toți nutrienții pe care și i-ar putea dori gazonul dvs., reuniți într-unul singur: aceste microgranule cu un singur compus sunt ușor de dispersat rapid și uniform și se bucură de tehnologiile noastre de peliculară brevetate MU2 și Silk. Momentum conține NPK într-un raport clasic de 4:1:2, cu azot și potasiu atât în formă standard, cât și în formă cu eliberare lentă, pentru a vă hrăni gazonul timp de până la 6-8 săptămâni. De asemenea, formula sa conține și magneziu pentru un plus de culoare și oligoelemente pentru o sănătate optimă. Potrivit pentru orice suprafață de gazon fin și este util mai ales primăvara și vara, atunci când gazonul se află în cele mai active perioade de creștere.

Beneficii

- Creșteți calitatea gazonului în sezonul activ de creștere
- Simplu de dispersat
- Eliberare susținută a nutrienților timp de 6-8 săptămâni

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe gazonul uscat și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat. Irigarea contribuie la dispersie și reduce riscul de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tăiate scurt. Udarea după aplicare va reduce la minimum amprentele. Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 2 Amânați folosirea scarificatorului vertical și curățarea până la 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea corespunzătoare a granulelor. Se eliberează semnificativ mai puțin azot atunci când temperaturile solului sunt sub 10 °C.
- 3 Dacă este vărsat pe trotuar, beton, haine etc., îndepărtați imediat, deoarece poate păta. Conține fier: nu aplicați dacă există riscul de contact cu beton, marmură, piatră, țesăturie sau piscine.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză recomandată:

20 – 30 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.