



Sierraform® GT

Anti-Stress

Stresul nu este necesar

15 | 0 | 26 | TE
N P2O5 K2O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot ureic (N-Urea)	7.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	7.8%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	26%
	Solubil (K2O)	26.0%
Fe	Fier	1.00%

Descriere

Dacă știți că gazonul va avea de suferit, presărați Sierraform® GT Anti-Stress în avans pentru a-l ajuta să treacă peste stres și pentru a-l menține în formă maximă. O porție suplimentară de potasiu îl va fortifica pentru orice i-ar rezerva viața. Perfect vara sau toamna, în zonele cu gazon fin. Pe lângă azot și potasiu standard, se poate lăuda și cu o eliberare lentă a acestora, pentru a menține efectele timp de 6-8 săptămâni și pentru a reduce la minimum vârfurile de creștere, plus fier pentru a îmbunătăți culoarea gazonului. În plus, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la problemele de acumulare a fosforului în sol, deoarece fosforul lipsește cu desăvârșire. Microgranulele sale omogene cu un singur compus, dispun de tehnologiile noastre speciale brevetate de peliculare MU2 și Silk.

Beneficii

- \\ Pregătirea perfectă înainte de stres
- \\ NPK în formă standard, precum și azot și potasiu cu eliberare lentă
- \\ Culoare îmbunătățită și gazon mai rezistent

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe gazonul uscat și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat. Irigarea contribuie la dispersie și reduce riscul de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tăiate scurt.
- 2 Udarea după aplicare va reduce la minimum amprente. Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 3 Amânați folosirea scarificatorului vertical și curățarea până la 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea corespunzătoare a granulelor. Se eliberează semnificativ mai puțin azot atunci când temperaturile solului sunt sub 10 °C.
- 4 Dacă este vărsat pe trotuar, beton, haine etc., îndepărtați imediat, deoarece poate păta. Conține fier: nu aplicați dacă există riscul de contact cu beton, marmur-, piatră, țesături sau piscine.
- 5 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză recomandată: 20 – 30 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.