



ProTurf®

18-0-7+3CaO+3MgO

Luați-o încet

18 | 0 | 7 | 8 | 3
N P2O5 K2O CaO MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	18%
	Azot (N-NH4)	1.5%
	Azot ureic (N-Urea)	14.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	1.9%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	7%
	Solubil (K2O)	7%
CaO	Oxid de calciu	8%
	Solubil	8%
MgO	Oxid de magneziu	3%
	Solubil	2.5%

Descriere

Încet și constant se câștigă orice cursă, iar gazonul dumneavoastră nu face excepție. Pentru o creștere lentă și constantă, apălați la ProTurf® 18-0-7+3CaO+3MgO. Tehnologia de îngrășământ cu eliberare controlată vă ajută gazonul să evite orice creșteri bruște nedorite. Garantează o reacție rapidă chiar în condiții mai reci, datorită porțiunilor nepelicate ale granulelor. Conținutul ridicat de magneziu va asigura culoarea verde intensă și sănătatea generală a gazonului.

Beneficii

- \\ Reacție rapidă a gazonului, chiar în condiții mai reci
- \\ Reacție rapidă a gazonului, chiar în condiții mai reci
- \\ Primul produs CRF excelent al sezonului

Mod de utilizare

- 1 Se aplică direct pe frunzișul uscat.
- 2 Udarea după aplicare facilitează dispersia și amplifică efectul imediat. A nu se aplica în perioade de secetă sau îngheț.
- 3 Aplicați după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, creștere și/sau carotaj pentru a evita deteriorarea granulelor.
- 4 În caz de vărsare pe pavaj, beton, haine etc., curățați imediat, deoarece produsul poate produce decolorare.
- 5 Asigurați-vă că sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 6 A se depozita în condiții uscate.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Intervalul dozelor recomandate:	20,00 - 35,00 g/m ²
---------------------------------	--------------------------------

Doza recomandată medie:	27,5 g/m ²
-------------------------	-----------------------

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.