



ProTurf®

15-6-15+7CaO+2.5MgO

Fortificați-vă gazonul

15 | 6 | 15 | 7.0 | 2.5
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot (N-NH4)	1.4%
	Azot ureic (N-Urea)	13.6%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	6%
	Solubil (P2O5)	5.7%
K2O	Oxid de potasiu	15%
	Solubil (K2O)	15.0%
CaO	Oxid de calciu	7.0%
	Solubil	5.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.5%
	Solubil	2.5%

Descriere

Dacă v-ați săturat de gazonul obosit și problematic, fortificați-l cu ProTurf® 15-6-15+7CaO+2.5MgO. Fortificați-vă gazonul cu acest mini-îngrășământ bogat în polihalit, care combină tehnologiile de eliberare controlată și de îngrășământ complex. Acesta are un conținut ridicat de potasiu, magneziu, calciu și sulf, toate într-un strat peliculat pe bază de azot. Fortificați-vă gazonul suficient pentru a rezista celor mai fierbinți zile de vară și celor mai geroase ierni.

Beneficii

- \\ Curat, inodor și foarte solubil pentru a reduce la minimum influența asupra jocului
- \\ Doză flexibilă fără efectul de „pete de leopard”
- \\ Efect rapid de intensificare a culorii și creștere controlată a gazonului

Mod de utilizare

- 1 Se aplică direct pe frunzișul uscat.
- 2 Udarea după aplicare facilitează dispersia și amplifică efectul imediat. A nu se aplica în perioade de secetă sau îngheț.
- 3 Pentru a reduce riscul de apariție a urmelor pe gazon, udați după aplicare. Aplicați după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, creștere și/sau carotaj pentru a evita deteriorarea granulelor.
- 4 Sigilați corect sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 5 A se depozita în spații uscate.
- 6 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Intervalul dozelor recomandate:	20,00 - 35,00 g/m ²
---------------------------------	--------------------------------

Doza recomandată medie:	27,5 g/m ²
-------------------------	-----------------------

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.