



Sierrablen® Plus

Spring starter 4-5M

Detașați-vă rapid de restul formației

24 | 5 | 8 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	24%
	Azot (N-NO3)	5.4%
	Azot (N-NH4)	6.3%
	Azot ureic (N-Urea)	12.3%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P2O5)	3.7%
K2O	Oxid de potasiu	8%
	Solubil (K2O)	8.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%

Descriere

Începeți sezonul de creștere exact așa cum doriți să îl continuați, cu îngrășământul Sierrablen® Plus Spring Starter 4-5M. Prin includerea tehnologiilor brevetate Poly-S și PACE ale companiei ICL, îi puteți oferi gazonului o eliberare controlată a nutrienților o mare parte din lunile de vară, datorită longevității sale predefinite de 4-5 luni. Pe lângă creșterea echilibrată și sănătoasă pe tot parcursul anului, vă veți bucura și de un gazon verde luxuriant datorită conținutului său de magneziu adăugat.

Mod de utilizare

- 1 Aplicați direct pe frunzele uscate.
- 2 Udarea după aplicare ajută la dispersare și amplifică efectul imediat. Nu aplicați în condiții de secetă sau de îngheț.
- 3 Se recomandă aplicarea după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, brăzdare și/sau carotaj pentru a preveni deteriorarea granulelor.
- 4 Conține fier: Nu lăsați produsul să intre în contact cu marmura, piatra, țesături, beton, piscine etc. Deoarece produsul poate provoca decolorarea, spălați imediat dacă este vărsat pe beton, plăci de pavaj, haine etc.
- 5 Sigilați corect sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 6 A se depozita în condiții uscate.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză medie recomandată:

37,5 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.