



Sierrablen®

14-5-21+2MgO

Sezoanele de creștere – un meci cu două reprize

14 | 5 | 21 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	14%
	Azot (N-NH ₄)	1.4%
	Azot ureic (N-Urea)	12.6%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	21%
	Solubil (K ₂ O)	21.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
Cu	Cupru	0.050%
Fe	Fier	0.80%
Mn	Mangan	0.30%
Zn	Zinc	0.100%

Descriere

Prelunghiți-vi viața gazonului cu îngrășământul mineral Sierrablen® 14-5-21+2MgO. Întrețineți o gamă largă de suprafețe gazonate, de la terenuri de sport la zone de tee pe terenuri de golf, cu tehnologia Poly-S concepută de ICL. Creșterea reprezintă un meci cu două reprize, deci duceți gazonul în a doua repriză a sezonului de creștere cu acest îngrășământ cu azot cu eliberare controlată. Oferiți-le plantelor exact nutrienții de care au nevoie pentru a crește și a lupta împotriva stresului, exact atunci când au nevoie.

Beneficii

- \\ Nivel crescut de magneziu pentru o culoare și o stare de sănătate excepționale
- \\ Perioadă de longevitate predefinită de 4-5 luni
- \\ Azot eliberat doar în condiții de creștere optime

Mod de utilizare

- 1 Aplicați direct pe frunzele uscate.
- 2 După aplicare, udarea ajută la dispersare și amplifică efectul imediat. Nu aplicați în condiții de secetă sau de îngheț.
- 3 Se recomandă aplicarea după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, brăzdare și/sau carotaj pentru a preveni deteriorarea granulelor.
- 4 Conține fier: Nu lăsați produsul să intre în contact cu marmura, piatra, țesături, beton, piscine etc. Deoarece produsul poate provoca decolorarea, spălați imediat dacă este vărsat pe beton, plăci de pavaj, haine etc.
- 5 Sigilați corect sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 6 A se depozita în condiții uscate.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză medie recomandată:	32,5 g/m ²
-------------------------	-----------------------

Doză recomandată:	25,00 - 40,00 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.