



Sportsmaster® Base

Fairway

Păstrați aspectul fantastic al zonelor de fairway

12 | 6 | 9 | 16.0 | 2.0
N P2O5 K2O CaO MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot (N-NH4)	1.4%
	Azot ureic (N-Urea)	10.6%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	6%
	Solubil (P2O5)	5.7%
K2O	Oxid de potasiu	9%
	Solubil (K2O)	9.0%
CaO	Oxid de calciu	16.0%
	Solubil	4.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%

Descriere

Sportsmaster® Base Fairway vă menține gazonul de fairway în formă maximă în timpul primăverii și verii, când iarba prezintă cea mai accentuată creștere. Calciul încorporat conferă plantelor rezistență la nivel celular pentru ca gazonul să reziste mai bine la uzură, în timp ce magneziul stimulează fotosinteza și scoate în evidență o culoare minunată. În plus, înlocuiește posibili nutrienți pierduți prin tunderea ierbii, inclusiv azotul și fosforul.

Beneficii

- \\ Ideal primăvara și vara pentru o creștere susținută a ierbii
- \\ Calciu pentru plante cu celule rezistente și gazon robust
- \\ Magneziu pentru îmbunătățirea fotosintezei și creșterea intensității culorii fotosinteză îmbunătățită și răspuns cromatic superior

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe frunzele uscate, din martie până în august.
- 2 Irigarea va ajuta la dispersare, reducând la minim riscul de ridicare a produsului de pe suprafețele proaspăt tunse cu mașina de tuns iarba.
- 3 Irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat între timp.
- 4 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă. Pentru a permite granulelor să disperseze, așteptați 3 zile după aplicare înainte de tăiere sau curățare.
- 5 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză recomandată:

35-50 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.