



Agroleaf[®] Liquid

High N

Pentru culturile care au nevoie de un impuls de azot

15 | 5 | 5 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot ureic (N-Urea)	15%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Oxid de potasiu	5%
	Solubil (K ₂ O)	5%
B	Bor	0.02%
	Solubil	0.02%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.060%
	Solubil	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Solubil (Mn)	0.030%
	Mangan chelat de EDTA	0.030%
Mo	Molibden	0.001%
	Solubil	0.001%
Zn	Zinc	0.015%
	Solubil	0.015%
	Zinc chelat de EDTA	0.015%

Descriere

Agroleaf Liquid High N este un îngrășământ foliar lichid NPK de înaltă calitate, cu o proporție mai mare de azot pentru a preveni și/sau corecta orice deficiență. Îmbogățit cu un pachet consistent de oligoelemente chelate, Liquid High N este special conceput pentru creșterea vegetativă. Agroleaf Liquid High N este formulat cu tehnologia unică F3 SurfActive de la ICL, care crește eficiența fiecărei aplicații foliare prin 3 căi: pentru o mai bună răspândire, adezivitate și retenție. F3 acționează prin scăderea tensiunii superficiale a picăturilor, astfel încât nutrienții pot fi mai bine răspândiți pe frunze; acest lucru duce la o mai mare acoperire și absorbția de nutrienți îmbunătățită. În plus, mai mulți nutrienți sunt reținuți decât să se scurgă sau să ricoșeze de pe frunzele cerate. Mai mult, tehnologia F3 permite formarea unor mici depozite de nutrienți pe suprafața frunzei, care sunt reactivate după reumidificare; acest lucru previne evaporarea, prelungind astfel nutriția pentru o aplicare foliară îmbunătățită.

Beneficii

- \\ Furnizează azot culturilor pentru o creștere sporită
- \\ De asemenea, conține oligoelemente chelate
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

- 1 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume fructifere, Generalități	3-6	300-600	1	Stabilirea și creșterea vegetativă, de 2-3 ori
Brassicas, broccoli conopidă	3-6	300-600	1	Creșterea vegetativă, de 3-4 ori
Ceapa, usturoiul	3-6	300-600	1	De la 2-3 frunze de până la 8-9 frunze, de 3-4 ori
Fructe moi, Livezi, Podgorii	3-6	600-1000	0.5-0.6	Creșterea vegetativă, de 1-2 ori
Cereale	5-10	200-300	2.5-3.3	1 internod – înainte de înflorire, de 2-3 ori
Porumb	5-10	200-300	2.5-3.3	De la 4-6 frunze, de 1-2 ori
Rapiță oleaginoasă	5-10	200-300	2.5-3.3	Creșterea vegetativă - primul mugur vizibil de 1-2 ori
Ornamentale	2-3	600-1000	0.3	Creșterea vegetativă, de 1-2 ori

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.