



Agroleaf[®] Liquid

High K

Potasiu lichid cu trei căi de acțiune pentru nutriția continuă a plantelor

8 | 8 | 16 | TE
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	8%
	Azot ureic (N-Urea)	8%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	8%
	Solubil (P ₂ O ₅)	8%
K ₂ O	Oxid de potasiu	16%
	Solubil (K ₂ O)	16%
B	Bor	0.020%
	Solubil	0.020%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.060%
	Solubil	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Solubil (Mn)	0.030%
	Mangan chelat de EDTA	0.030%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.015%
	Solubil	0.015%
	Zinc chelat de EDTA	0.015%

Descriere

Agroleaf Liquid High K este un îngrășământ foliar lichid de înaltă calitate care previne și corectează deficitul de potasiu. Este îmbogățit cu pachet de oligoelemente chelate. Agroleaf Liquid High K conține tehnologia unică F3 SurfActive, dezvoltată de ICL, care crește eficiența fiecărei aplicații foliare pe 3 căi, oferind o mai bună răspândire, adezivitate și retenție. Tehnologia F3 scade tensiunea superficială a picăturilor. Nutrienții pot fi apoi mai bine răspândiți pe frunze, rezultând o zonă acoperită mai mare și o mai bună absorbție a nutrienților. Mai puțini nutrienți se vor scurge sau vor ricoșa de pe frunzele cerate, oferind o mai bună retenție a nutrienților. Iar tehnologia F3 ajută, de asemenea, la formarea unor mici depozite de nutrienți pe suprafața frunzei, care sunt reactivate după reumidificare, prevenind evaporarea și oferind o nutriție prelungită pentru o aplicare foliară îmbunătățită.

Beneficii

- \\ Corectează și previne deficitul de potasiu pentru a reduce stresul
- \\ Îmbogățit cu oligoelemente chelate
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

- 1 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume, Alte culturi	5-10	300-600	1.7	Stabilirea fructelor-recoltare de 4-5 ori
Salate, varză	3-5	300-600	1	După formarea căpățânei de 2-3 ori
Ceapa, usturoiul	3-6	300-600	1	La mărirea bulbului de 1-2 ori
Fructe perisabile, Livezi, Podgorii	5-10	600-1000	0.8-1	Stabilirea fructelor - cu 2 săptămâni înainte de recoltare de 4-5 ori
Cartof	3-6	250-300	1.2-2	Creșterea tuberculilor de 2-3 ori
Floarea soarelui	3-6	200-300	1.5-2	Începutul înfloririi
Rapiță	3-6	200-300	1.5-2	Începutul înfloririi
Culturi ornamentale	2-3	600-1000	0.3	Înainte și după înflorire de 1-2 ori

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.