



Nova

Quick-Mg

Quick-Mg, răspuns rapid

0 | 0 | 15 | 13.0
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	15%
	Solubil (K2O)	15.0%
MgO	Oxid de magneziu	13.0%
	Solubil	13.0%

Caracteristici

Descriere

Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO este formula noastră unică cu potasiu și magneziu: perfectă pentru culturile care au cea mai mare nevoie de acești nutrienți, cum ar fi sfecla de zahăr, cartofii și multe altele (este excelent pentru solurile care pot avea deficit de magneziu). Nu va dura mult până când veți observa diferența. Conținutul ridicat de magneziu al Quick-Mg într-o formă de absorbție rapidă le va face să fie utilizate în cel mai scurt timp. Aici este vorba despre nutrienți de înaltă puritate și conținut redus de sodiu. Este ideal pentru fertilizare cu solubilitatea sa ridicată de 680 g/l apă (la 20°C)

Beneficii

- \\ Sursă eficientă de calciu și potasiu
- \\ Absorbție rapidă pentru un răspuns rapid
- \\ Ușor de dizolvat

Mod de utilizare

- 1 Deoarece este compatibil cu majoritatea celorlalte îngrășăminte (azot, potasiu, calciu și, în situații specifice, fosfor), Nova Quick-Mg poate servi ca unul dintre blocurile de construcție ale programelor de nutriție minerală ale majorității culturilor.
- 2 Este foarte recomandat, de exemplu, să-l aplicați simultan cu Nova Ferti-K, la un raport de 1:1,2 (w/w) din Nova Quick-Mg:Nova Ferti-K.
- 3 Acest amestec va avea un raport benefic de 6,7:1 g/g de $K^+ : Mg^{+2}$, ceea ce reflectă raportul ideal dintre acești cationi în celulele plantelor. O pondere semnificativ mai mare de K poate reduce considerabil absorbția de Mg de către rădăcinile plantelor.
- 4 Următoarele culturi pot fi foarte receptive la aplicarea Nova Quick-Mg: lucernă, trifoi, boabe mici, porumb, trestie de zahăr, sfeclă, sfeclă de zahăr, pășuni, broccoli, varză, conopidă, țelină, castraveți, vinete, piper, cartof, dovleac, spanac, dovlecel, roșii, pepene verde, afine, conifere.
- 5 Situații în care utilizarea Nova Quick-Mg trebuie verificată sau evitată cu atenție: condiții saline, conductivitate electrică înaltă (EC) a apei de irigare sau a soluției solului. Culturi sensibile la salinitate și/sau clorură, cum ar fi căpșuni, ceapă, morcov, fenicul, ridiche, salată verde, multe specii de flori, tutun, struguri.
- 6 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Rata de diluție recomandată pentru soluțiile de bază: 10-15 kg/100 l

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.