



Solinure[®] GT

7

Ajutați-vă plantele să crească

18 | 11 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	18%
	Azot (N-NO3)	3.3%
	Azot (N-NH4)	11.3%
	Azot ureic (N-Urea)	3.4%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	11%
	Solubil (P2O5)	11.0%
K2O	Oxid de potasiu	11%
	Solubil (K2O)	11.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Caracteristici

Descriere

Oferiți culturilor dvs. de seră și din spații protejate nutrienții optimi cu îngrășământul prin fertilizare Solinure[®] GT 7. Această formulă NPK cu concentrație înaltă de azot a fost proiectată special având în vedere plantele din spații protejate, special adaptate pentru aplicare în timpul etapei lor de creștere vegetativă. Cu conținut redus de uree și fără clorură, plantele dvs. se vor bucura de un pachet de oligoelemente complet chelate, împreună cu magneziu adăugat pentru o creștere sănătoasă.

Beneficii

- \\ Ideal pentru aplicarea din spații protejate
- \\ Fabricat pentru stadiul de creștere vegetativă a plantelor
- \\ Produs extrem de fiabil

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 7 pentru etapele vegetative de creștere a culturilor.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL s

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, copaci, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.