



Solinure® GT

5

Vă ajută culturile să treacă peste iarnă cu brio

20 | 20 | 20 | TE
N P2O5 K2O

5

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	20%
	Azot (N-NO3)	5.9%
	Azot (N-NH4)	3.8%
	Azot ureic (N-Urea)	10.3%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	20%
	Solubil (P2O5)	20.0%
K2O	Oxid de potasiu	20%
	Solubil (K2O)	20.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Caracteristici

Descriere

Pentru nutriție completă, nu căutați altceva decât îngrășământul prin fertirigare Solinure® GT 5. Cu formula sa NPK echilibrată, acest îngrășământ mereu fiabil este soluția ideală pentru a vă ajuta plantele din spații protejate în etapele lor solicitante de creștere și maturare, fiind în același timp perfect potrivit pentru a ajuta culturile în acele perioade dificile de producție din iarnă. Cu cât mai puțină uree posibil și complet fără cloruri, plantele dvs. vor beneficia cu siguranță de pachetul său de oligoelemente complet chelat și de magneziu adăugat.

Beneficii

- \\ Formulă NPK echilibrată
- \\ De încredere maximă
- \\ Fabricat pentru aplicarea în etapele de creștere și maturare

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 5 pentru etapele de creștere și maturare.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, fructe moi și sâmburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.