



Solinure[®] GT

6

Obțineți tot ce este mai bun din culturile de iarnă

15 | 15 | 15 | TE
N P₂O₅ K₂O

6

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot (N-NO ₃)	3.4%
	Azot (N-NH ₄)	11.6%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	15%
	Solubil (P ₂ O ₅)	15.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	15%
	Solubil (K ₂ O)	15.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Caracteristici

Descriere

Ajutați-vă culturile cultivate în spații protejate să treacă prin lunile reci ale anului cu îngrășământul prin fertilizare Solinure GT 6. Acest îngrășământ NPK echilibrat a fost perfect conceput pentru a vă ajuta plantele în timpul etapelor de creștere și maturare, acoperind fiecare cerință nutrițională de bază. Această formulă ultra-fiabilă conține un pachet de oligoelemente complet chelat, în timp ce este, de asemenea, lipsit de uree și cloruri nedorite.

Beneficii

- \\ Fabricat pentru aplicarea în spații protejate
- \\ Are un raport NPK echilibrat
- \\ Complet fără clorură

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 6 pentru etapele de creștere și maturare.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, copaci, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.