



Solinure® GT

4

Oferiți plantelor dumneavoastră nutriția de care au nevoie, atunci când au nevoie de ea

14 | 6 | 23 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

4

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	14%
	Azot (N-NO ₃)	6.1%
	Azot (N-NH ₄)	7.9%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	6%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	23%
	Solubil (K ₂ O)	23.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Descriere

Dacă culturile dvs. de fructe și legume necesită o fertilizare specială aplicați îngrășământul prin fertirigare Solinure® GT 4. Completat cu un pachet de oligoelemente adăugate, această formulă NPK cu conținut ridicat de potasiu, cu conținut scăzut de fosfor, este concepută pentru a vă ajuta plantele cultivate în spații protejate în etapele lor de creștere și maturare, chiar și în timpul perioadelor reci ale anului. Dați plantelor numai ceea ce au de fapt nevoie, cu o soluție care nu conține cloruri și cu conținut minim de uree.

Beneficii

- Recomandat pentru aplicarea în câmp și în spații protejate
- Raport NPK cu conținut ridicat de potasiu și conținut de fosfor scăzut
- Complet fără clorură

Caracteristici

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 4 pentru etapele de creștere și maturare, împreună cu producția culturilor de iarnă.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.