



Solinure® GT

9

Dați un start culturilor de legume cu Solinure® GT 9

11 | 35 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

9

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	11%
	Azot (N-NO3)	2.1%
	Azot (N-NH4)	8.9%
P2O5	Phosphorus Pentoxide	35%
	Solubil (P2O5)	35.0%
K2O	Potassium Oxide	11%
	Solubil (K2O)	11.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Boron	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Copper	0.002%
	Water soluble (Cu)	0.002%
	Copper EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Iron	0.04%
	Solubil	0.04%
	Iron EDTA (Fe)	0.04%
Mo	Molybdenum	0.002%
	Water soluble (Mo)	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Water soluble (Zn)	0.002%
	Zinc EDTA (Zn)	0.002%

Caracteristici

Descriere

Oferiți-le culturilor dvs. de fructe și legume cel mai bun început posibil cu îngrășământul prin fertirigare Solinure® GT 9. Această formulă NPK cu concentrație ridicată de fosfor are tot ce aveți nevoie pentru a oferi plantelor dumneavoastră acel impuls suplimentar în etapele lor de pornire, îmbunătățind în același timp dezvoltarea rădăcinilor lor. Cu pachetul său de oligoelemente complet chelat și magneziu adăugat, fără cloruri sau uree, aceasta este soluția perfectă pentru orice aplicații din spații protejate, oferind plantelor dumneavoastră o creștere sănătoasă completă.

Beneficii

- \\ Raport NPK cu concentrație înaltă de fosfor
- \\ Ajută plantele în timpul etapelor lor de pornire
- \\ De încredere maximă

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 9 pentru etapele de inițiere ale creșterii culturilor sau pentru a îmbunătăți dezvoltarea rădăcinilor.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, copaci, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Attention

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.