



Solinure[®] GT

2

Păstrați-vă culturile de fructe înfloritoare în fiecare etapă și sezon

7 | 19 | 38 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

2

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	7%
	Azot (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	19%
	Solubil (P ₂ O ₅)	19.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	38%
	Solubil (K ₂ O)	38.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Caracteristici

Descriere

Îngrășământul prin fertirigare Solinure GT 2 este o formulă NPK cu conținut ridicat de potasiu și conținut scăzut de azot. Este soluția dvs. ideală pentru a vă ajuta culturile din sere și solarii în stadiile de creștere și maturare, cât și în acele luni răcoroase și lipsite de lumină în timpul iernii. Deși nu conține cloruri și uree, plantele dvs. vor fi stimulate de magneziu adăugat în acest produs de încredere, împreună cu pachetul său de oligoelemente complet chelat.

Beneficii

- \\ Perfect pentru etapele de creștere și maturare a fructelor
- \\ Perfect pentru aplicare în sere și solarii
- \\ Include adaos de magneziu și oligoelemente

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 2 pentru etapele de creștere și maturare a fructelor, împreună cu producția culturilor de iarnă.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.