



Solinure[®] GT

3

Profitați la maximum de culturile dvs. de fructe cu Solinure GT 3

12 | 5 | 35 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

3

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot (N-NO ₃)	8.1%
	Azot (N-NH ₄)	2.1%
	Azot ureic (N-Urea)	1.8%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	35%
	Solubil (K ₂ O)	35.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.002%
	Solubil	0.002%
	Cupru chelat de EDTA	0.002%
Fe	Fier	0.04%
	Solubil	0.04%
	Fier chelat de EDTA	0.04%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.002%
	Solubil	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Solubil	0.002%
	Zinc chelat de EDTA	0.002%

Descriere

Profitați la maximum de fertilizarea dedicată sistemelor tunelare și de culturile de fructe cultivate în seră cu îngrășământul prin fertirigare Solinure GT 3. Cu formula sa NPK cu conținut scăzut de azot, cu conținut ridicat de potasiu, aceasta este soluția perfectă atunci când vine vorba de etapele de creștere și maturare a fructelor, împreună cu stimularea lor în perioadele reci ale anului. Conținând magneziu, împreună cu un pachet de oligoelemente complet chelat, acest produs extrem de fiabil nu conține cloruri și uree, oferind plantelor dumneavoastră doar nutrienții necesari.

Beneficii

- \\ Ajută în lunile lipsite de lumină și răcoroase de iarnă
- \\ Fără uree și cloruri
- \\ Include magneziu și un pachet complet de oligoelemente

Caracteristici

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® GT 3 pentru etapele de creștere și coacere a fructelor, împreună cu producția culturilor de iarnă.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Culturi și legume în câmp deschis și arii protejate:	40-60 kg/ha pe săptămână
Culturi de fructe de pădure, fructe moi și sămburoase:	30-50 kg/ha pe săptămână

*Rata medie recomandată: Aplicați 4-5 kg/1000m² pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.