



Solinure®

7 High N

Fortificați plantele puternice cu High-N

24 | 12 | 12 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	24%
	Azot (N-NO3)	1.2%
	Azot (N-NH4)	4.0%
	Azot ureic (N-Urea)	18.8%
P2O5	Phosphorus Pentoxide	12%
	Solubil (P2O5)	12.0%
K2O	Potassium Oxide	12%
	Solubil (K2O)	12.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Boron	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Copper	0.002%
	Water soluble (Cu)	0.002%
	Copper EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Iron	0.04%
	Solubil	0.04%
	Iron EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Manganese	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Manganese EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molybdenum	0.002%
	Water soluble (Mo)	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Water soluble (Zn)	0.002%
	Zinc EDTA (Zn)	0.002%

Caracteristici

Descriere

Utilizați Solinure 7 high-N ca nutriție de ultimă generație când vine vorba nutriția culturilor de legume și fructe din câmp, sere și solarii. Completat cu adaos de magneziu, împreună cu un pachet complet de oligoelemente pentru o performanță mai sporită a plantelor, această formulă NPK cu concentrație înaltă de azot este adaptată nevoilor nutriționale specifice ale plantelor dvs. Acest lucru îl face o soluție rentabilă pentru creștere și rezultate excelente.

Beneficii

- \\ Fără clorură
- \\ Potrivit pentru stimularea creșterii vegetative
- \\ Este adăugat magneziu și pachetul complet de oligoelemente

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure 7 High N pentru stimularea creșterii vegetative a plantelor în timpul etapelor lor vegetative.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Asigurați-vă că sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Doze de aplicare

Rată

40-60 kg/ha pe săptămână

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Attention

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.