



Agroblen®

11-21-9+6MgO amestecare în vrac

Culegeți roadele muncii dvs.

11 | 21 | 9 | 6.0
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	11%
	Azot (N-NO ₃)	3.0%
	Azot (N-NH ₄)	8.0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	21%
	Solubil (P ₂ O ₅)	15.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	9%
	Solubil (K ₂ O)	9.0%
MgO	Oxid de magneziu	6.0%

Descriere

Fertilizați-vă culturile forestiere, viticole și horticole cu Agroblen® 11-21-9+6MgO 8-9M. Acest îngrășământ NPK cu conținut ridicat de fosfor este îmbogățit cu adaos de calciu, magneziu, sulf și bor pentru a oferi plantelor un pachet cuprinzător de nutrienți care promovează dezvoltare optimă. Stați liniștiți și urmăriți cum plantele se dezvoltă pe o perioadă predefinită de 8-9 luni, datorită unei combinații de materii prime de înaltă calitate cu tehnologia brevetată de eliberare a rășinii de la ICL.

Beneficii

- \\ Raportul NPK conceput pentru stabilirea culturilor pe termen lung
- \\ Concentrație mărită de fosfor pentru plantațiile noi
- \\ Ecologic datorită pierderilor minime de nutrienți
- \\ Poate fi aplicat în găurile de plantare chiar înainte de plantare
- \\ Nivel înalt de magneziu pentru a maximiza fotosinteza

Mod de utilizare

..

- 1 Aplicați folosind metoda plantării în orificiul de plantare.
- 2 Puteți utiliza, de asemenea, metode de aplicare în rânduri sau prin difuzare.
- 3 Nu se aplică mai târziu de 1-2 săptămâni înainte de plantare.
- 4 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 5 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 6 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 7 Reduceți doza aplicată dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 8 A se păstra în condiții uscate.
- 9 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 10 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.



Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Livezi (plantații noi):	75-100 g/plantă
Podgorii și fructe moi (mure, zmeură, coacăze) (plantații noi):	10-20 g/plantă

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.