



Agroblen®

17-9-8+4MgO gauri

Dați viață culturilor dvs.

17 | 9 | 8 | 4,0
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	17%
	Azot (N-NO ₃)	7.5%
	Azot (N-NH ₄)	9.5%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	9%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	8%
	Solubil (K ₂ O)	8.0%
MgO	Oxid de magneziu	4.0%

Descriere

Când vine primăvara, asigurați-vă că fertilizați cu Agroblen 17-9-8+4MgO 8-9M. Acest îngrășământ granular NPK cu conținut înalt de azot a fost special formulat pentru a vă ajuta să vă stabiliți noile plantații temperate și subtropicale, cum ar fi avocado și citrice. Cu adaos de magneziu pentru fotosinteză îmbunătățită, acest produs este ideal pentru aplicații de primăvară. Datorită tehnologiei patentate ICL de eliberare a nutrienților, plantele dumneavoastră se pot bucura de o eliberare controlată, susținută și fiabilă de nutrienți timp de 8-9 luni.

Beneficii

- \\ Nivel ridicat de azot care promovează creșterea vegetativă
- \\ Poate fi aplicat în gropile de plantare chiar înainte de plantare
- \\ Creșterea uniformă a culturilor datorită eliberării constante și susținute de nutrienți
- \\ Magneziu suplimentar pentru fotosinteză îmbunătățită

Mod de utilizare

- 1 Aplicați folosind metoda plantării în locația de plantare.
- 2 Puteți utiliza, de asemenea, metode de aplicare în rânduri, în locașe sau prin difuzare.
- 3 Nu se aplică mai târziu de 1-2 săptămâni înainte de plantare.
- 4 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 5 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 6 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 7 Reduceți doza aplicată dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 8 A se păstra în condiții uscate. Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.

Doze de aplicare

Culturi:	Rată
Livezi (plantații noi):	75-100 g/plantă
Avocado: plante cultivate în ghivece de 3 litri. Mod de aplicare: (amestecat cu solul din jurul rădăcinilor):	50 g/plantă
Avocado: plante cultivate în ghivece de 6 litri. Mod de aplicare: (amestecat cu solul din jurul rădăcinilor):	100 g/plantă
Citrice (plantații noi, cu plante tinere din saci de polietilenă de 4-6 litri):	150-200 g/plantă
Cafea (plantații noi):	50-100 g/plantă
Alte culturi potrivite: Podgorii și fructe moi (mure, zmeură, coacăze) (plantații noi):	10-20 g/plantă

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.