



Agroleaf® Liquid

High P

Високий вміст фосфору для вдоволених плодовитих рослин

5 | 25 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	5%
	Амонійний азот (N-NH ₄)	5%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	25%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	25%
K ₂ O	Оксид калію	5%
	Водорозчинний (K ₂ O)	5%
B	Бор	0.02%
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.060%
	Водорозчинний (Fe)	0.060%
	Хелат заліза (EDDHA) (Fe)	0.06%
Mn	Манган	0.030%
	Водорозчинний (Mn)	0.030%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.030%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.015%
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Опис

Agroleaf® Liquid High P - це високоякісне азотно-фосфорно-калієве рідке добриво позакореневого внесення з приголомшливим 25% вмістом пентоксиду фосфору, що допоможе впоратися із нестачею фосфору. Продукт збагачений перевіреним комплексом мікро- і макроелементів у хелатній формі. Agroleaf® Liquid High P розроблений спеціально для вегетативного росту. Продукт використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення добрив. Ваші рослини насолоджуються кращим нанесенням, адгезією та утриманням поживних речовин. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це збільшує площу покриття добривом та покращує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 також уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину води. Це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Доза внесення (г/га)	Частота внесення (раз/сезон)	Час внесення
Плодоносні овочі, Загальні	3- 300- 6 600	1	1 тиждень після посадки, перед і після цвітіння, 2-3 рази
Полуниця, Листяні овочі, Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3- 300- 6 600	1	Після посадки, 1-2 рази
Цибуля, Часник	3- 300- 6 600	1	При появі 2-3 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3- 600- 6 1000	0.5- 0.6	Перед цвітінням і за 2 тижні до збору врожаю, 1-2 рази
Картопля	3- 250- 6 300	1.2-2	Перед ініціацією бульб, 1-2 рази
Кукурудза	3- 200- 6 300	1.5-2	При появі 4-6 листків, 1-2 рази
Ріпак	3- 200- 6 300	1.5-2	Восени чи ранньою весною
Декоративні рослини	2- 600- 3 1000	0.3	1 тиждень після пересадки у горщик чи проростання і перед цвітінням, 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.