



## Agroleaf® Liquid

### Zinc

Нагодуйте свої рослини цинком

0 | 0 | 0 | TE  
N P2O5 K2O



### Гарантований аналіз

| Оксид |                         |        |
|-------|-------------------------|--------|
| N     | Загальний азот          | 0%     |
| P2O5  | Пентоксид фосфору       | 0%     |
| K2O   | Оксид калію             | 0%     |
| Zn    | Цинк                    | 8.000% |
|       | Водорозчинний (Zn)      | 8.000% |
|       | Хелат цинку (EDTA) (Zn) | 8.000% |

### Опис

Agroleaf® Liquid Zinc - це наше високоякісне рідке добриво позакореневого внесення, створене з єдиною метою - запобігти й усунути наслідки нестачі цинку. Продукт був розроблений для різноманітних методів внесення, а також не містить натрію. Agroleaf® Liquid Zinc використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення трьома шляхами: покращуючи нанесення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину води; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

## Як користуватися

- 1
- Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

## Дози внесення

| Рекомендації для різних культур    | Дозування (у об'ємах води л/га) | Концентрація (%) | Частота внесення                                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Плодоносні овочі                   | 1-3 300-600                     | 0.3-0.5          | Впродовж усього циклу вегетації, 3-4 рази         |
| Картопля                           | 2-3 250-300                     | 0.8-1            | До і після цвітіння                               |
| Соняшник                           | 2-3 200-300                     | 1                | При появі 4-6 листків                             |
| Кукурудза                          | 2-3 200-300                     | 1                | При появі 4-6 листків                             |
| Зернові                            | 1-2 200-300                     | 0.5-0.7          | Ранньою весною                                    |
| Полуниця                           | 2-3 250-400                     | 0.8              | При появі квіткових бруньок і після цвітіння      |
| Ягоди, фруктові сади, виноградники | 3-6 600-1000                    | 0.5-0.6          | Від зав'язування плодів до збору врожаю, 3-4 рази |

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

## Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.