



Agroleaf® Liquid

Moly B

Ваше рідке добриво преміум-класу з бором і молібденом.

4 | 16 | 4
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	4%
	Амонійний азот (N-NH ₄ ⁺)	2.6%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	1.4%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	16%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	16%
K ₂ O	Оксид калію	4%
	Водорозчинний (K ₂ O)	4%
B	Бор	0.1%
	Водорозчинний (B)	0.1%
Mo	Молібден	2.00%
	Водорозчинний (Mo)	2.00%

Опис

Agroleaf® Liquid Moly B - це високоякісне азотно-фосфорно-калієве рідке добриво позакореневого внесення, яке збагачене бором і має високу концентрацію молібдену. Добриво розроблене для культур із високою потребою бору й молібдену і швидко усуває дефіцит цих елементів. Секрет добрива Agroleaf® Liquid Moly B - це технологія F3 SurfActive, спеціально розроблена ICL, щоб збільшити ефективність позакореневого внесення добрив. Ваші рослини почуватимуться краще через поліпшене нанесення, адгезію та утримання поживних речовин. Ця технологія зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це збільшує площу покриття добривом та покращує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 також уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи. Це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур (доза в літрах/га)

Культура	Доза (л/га)	Об'єм води (л/га)	Мінімальна температура (°C)	Частота внесення
Плодоносні овочі, Картопля	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	Впродовж усього періоду вегетації, Для культур, що ростуть на полі, після змикання рядків
Бобові (соеві боби)	1-2	300	0.3-0.7	При появі 6 листків
Капуста, Цвітна капуста, Броколі	1-3	300-600	0.3-0.5	При появі 6-8 листків, 2-3 рази
Ріпак	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Восени, Навесні до цвітіння, 2 рази
Соняшник	1-3	200-300	0.5-1	При появі 4-6 листків
Цукровий буряк	1-3	250-400	0.4-0.8	При появі 6-8 листків
Паша	0.5-1	200-300	0.25-0.3	Впродовж усього періоду вегетації, 2-3 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.