



Agroleaf® Liquid

Balance

Досягніть балансу в живленні ваших рослин

10 | 10 | 10 | TE
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	10%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	10%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	10%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Оксид калію	10%
	Водорозчинний (K ₂ O)	10%
B	Бор	0.02%
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.060%
	Водорозчинний (Fe)	0.060%
Mn	Манган	0.030%
	Водорозчинний (Mn)	0.030%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.030%
Mo	Молібден	0.001%
	Водорозчинний (Mo)	0.001%
Zn	Цинк	0.015%
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Опис

Вашим рослинам необхідний баланс. Agroleaf® Liquid Balance - це азотно-фосфорно-калієве добриво листового внесення вищого ґатунку, яке забезпечить рослинам збалансоване живлення через комплекс мікро- та макроелементів у хелатній формі. Balance містить 10% азот, пентоксид фосфору та оксид калію, а також водорозчинні залишкові сліди заліза, марганцю, бору, міді, молібдену та цинку. Agroleaf® Liquid Balance використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення трьома шляхами: покращуючи поширення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину води; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Зберігайте в сухому місці.
- 2 Щільно закривайте частково використані або пошкоджені упаковки продукту.
- 3 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур Доза внесення (г/га) Частота внесення (раз/рік)

Плодоносні овочі, Загальні	3-6	300-600	1	Зародковий період та вегетативний ріст, 1-2 рази
Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Після змикання листків у міжряддях 2-3 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	У фазі 8-9 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	1-4	600-1000	0.2-0.4	В період вегетативного росту 1-2 рази
Зернові	3-6	200-300	1.5-2	Від другого міжвузля до прапорцевого листка
Кукурудза	3-6	200-300	1.5-2	При появі 8-10 листків
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	Осінь чи рання весна
Соняшник	3-6	200-300	1.5-2	При появі 4-6 листків
Декоративні рослини	2-	600-	0.3	Впродовж усього циклу вирощування 2-3 рази

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.