



Agroleaf® Liquid

Booster

Зміцніть свої рослини багатою на азот рідиною

25 | 0 | 0 | 2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	25%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	4.2%
	Амонійний азот (N-NH ₄ ⁺ /sub)	2.8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	18.0%
P2O5	Пентоксид фосфору	0%
K2O	Оксид калію	0%
MgO	Оксид магнію	2%
	Водорозчинний (MgO)	2.0%
B	Бор	0.02%
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.060%
	Водорозчинний (Fe)	0.060%
Mn	Манган	0.03%
	Водорозчинний (Mn)	0.03%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.03%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.015%
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Опис

Стимулюйте вегетативний ріст за допомогою Agroleaf® Liquid Booster, нашого виняткового рідкого добрива позакореневого внесення. Засіб насичує ваші культури азотом і містить повний комплекс мікро- та макроелементів у хелатній формі. У складі Booster є 25% азот, а також водорозчинні залишкові сліди оксиду магнію, марганцю, бору, міді, молібдену та цинку. Секрет Agroleaf® Liquid Booster полягає у застосуванні нашої виняткової технології F3 SurfActive, створеної спеціально для того, щоб підвищити ефективність позакореневого внесення трьома шляхами: покращуючи нанесення, адгезію та утримання добрив. Технологія F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур Дозувальні корифи (г/га)

Овочі загалом	3-6	300-600	1	Зародковий період та вегетативний ріст, 2-3 рази
Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Вегетативний ріст, 3-4 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	У фазі від 2-3 до 8-9 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Вегетативний ріст, 1-2 рази
Зернові	5-10	200-300	2.5-3.3	Від першого міжвузля до початку цвітіння, 2-3 рази
Кукурудза	5-10	200-300	2.5-3.3	У фазі від 4-6 листків, 1-2 рази
Ріпак	5-10	200-300	2.5-3.3	Вегетативний ріст - при появі першої бруньки 1-2 рази
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Вегетативний ріст, 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.