



Agroleaf[®] Liquid

High K

Рідкий калій забезпечує постійне живлення рослини трьома способами

8 | 8 | 16 | TE
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	8%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	8%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	8%
K ₂ O	Оксид калію	16%
	Водорозчинний (K ₂ O)	16%
B	Бор	0.020%
	Водорозчинний (B)	0.020%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.060%
	Водорозчинний (Fe)	0.060%
Mn	Манган	0.030%
	Водорозчинний (Mn)	0.030%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.030%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.015%
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Опис

Agroleaf[®] Liquid High K - це високоякісне рідке добриво позакореневого внесення, яке запобігає та за потреби усуває наслідки нестачі калію. Насичене комплексом мікро- і макроелементів у хелатній формі. Agroleaf[®] Liquid High K містить створену ICL унікальну технологію F3 SurfActive, яка підвищує ефективність кожного кореневого внесення трьома способами: покращуючи поширення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину води; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур Дозування в літній період (г/га)

Плодоносні овочі, Загальні	5-10	300-600	1.7	Від зав'язування плодів до збору врожаю 4-5 разів
Салати, Капустяні	3-5	300-600	1	Після формування головки 2-3 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	Після збільшення цибулин 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	5-10	600-1000	0.8-1	Зав'язування плодів - 2 тижні перед збором врожаю 4-5 разів
Картопля	3-6	250-300	1.2-2	Під час росту бульб 2-3 рази
Соняшник	3-6	200-300	1.5-2	На початку цвітіння
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	На початку цвітіння
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Перед та після цвітіння 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.