



Solinure® GT

2

Нехай ваші плодові культури процвітають незалежно від циклу вегетації й пори року

7 | 19 | 38 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

2

Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	7%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	19%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	19.0%
K ₂ O	Оксид калію	38%
	Водорозчинний (K ₂ O)	38.0%
MgO	Оксид магнію	2.0%
	Водорозчинний (MgO)	2.0%
B	Бор	0.01%
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.04%
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Манган	0.01%
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.002%
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Опис

Добриво для фертигації Solinure® GT 2 має NPK-формулу з високим вмістом калію й низьким вмістом азоту. Це ідеальне рішення для ваших фруктів у теплицях і тунельних системах не лише під час стадій росту й дозрівання плодів, а й під час холодних і темних зимових місяців. Цей надійний продукт не містить хлоридів та сечовини, і підживить ваші рослини додатковим магнієм та комплексом залишкових елементів у хелатній формі.

Переваги

- Идеальне для етапів росту й дозрівання плодів
- Створене для застосування у теплицях і тунельних системах
- Містить додатковий магній та залишкові елементи

Характеристики

Як користуватися

- 1 Використовуйте Solinure® GT 2 для стадій росту й дозрівання плодів, а також під час зимового плодоношення.
- 2 Зберігайте в сухих умовах.
- 3 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
- 4 Для детальних порад і рекомендацій, скontaktуйте з ICL чи вашим професійним радником.

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.