



Agroleaf[®] Liquid

Zinc M+

Одне вирішення проблеми нестачі як цинку, так і мангану.

0 | 0 | 0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	0%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	0%
K ₂ O	Оксид калію	0%
Mn	Манган	2.30%
	Водорозчинний (Mn)	2.30%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	2.30%
Zn	Цинк	3.700%
	Водорозчинний (Zn)	3.700%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	3.700%

Характеристики

Опис

Із Agroleaf[®] Liquid Zinc M+ проблема нестачі двох поживних елементів вирішується одним продуктом. Містить мікроелементи цинк і манган у хелатній формі. Можна використовувати у вигляді листового спрею чи фертигації як для орних культур, так і для деревних рослин. Zinc M+ може використовуватися для запобігання чи усунення наслідків нестачі цинку і мангану, і містить більше цинку, ніж його продукт-близнюк Agroleaf[®] Liquid Man Z+. Використовуйте як листовий спрей для орних культур в якості запобіжного засобу. Найкраще застосовувати Zinc M+ під час періоду найбільшого вегетативного росту. На плодових деревах рекомендується вносити під час ініціації та розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння. При нанесенні фертигацією, Zinc M+ рекомендується використовувати як запобіжний засіб.

Переваги

- Два в одному: усуває наслідки й запобігає дефіциту мангану й цинку
- Більше цинку, ніж в Agroleaf® Liquid Man Z+
- Підходить як для орних культур, так і для плодових дерев

Як користуватися

- 1** Загальні вказівки: проведіть 2-3 запобіжних нанесення на орні культури під час періоду найбільшого вегетативного росту, і на деревних культурах під час ініціації й розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння. Розбавляйте у співвідношенні 200-400 куб. см./гкл, не перевищуючи межі в 8 л./га на одне нанесення. При видимих симптомах дефіциту наносьте максимальну дозу.
- 2** Листковий спрей для citrusових: для citrusових нанесіть першу дозу навесні, при появі нових гілок, коли достатньо розвинуте молоде листя досягає 2/3 свого повного розміру. Застосуйте вразі впродовж 15 днів, і потім знову під час літнього цвітіння. При нанесенні менш ніж 2000 л./га, застосовуйте вищі дози (350 куб. см./гкл); при вищих дозах (до максимуму в 3000 л./га), застосовуйте половину дози (250 куб. см./га).
- 3** Плоди з кісточкою і насінні плоди: застосовуйте під час періодів найбільшого вегетативного росту, коли культура має достатню масу листя. Рекомендована доза становить 200-250 куб. см./гкл, максимальне використання 1000 л./га.
- 4** Овочі: рекомендована доза складає 150-200 куб. см./гкл. з максимальним використанням від 800 до 1000 л./га.



Дози внесення

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.