



**Agroleaf[®]
Liquid**

B-10

Більше бору для найкращої якості врожаю

0 | 0 | 0
N P2O5 K2O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	0%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	0%
	Амонійний азот (N-NH ₄)	0%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	0%
	Органічний азот	0%
P2O5	Пентоксид фосфору	0%
	Водорозчинний (P2O5)	0%
K2O	Оксид калію	0%
	Водорозчинний (K2O)	0%
B	Бор	10.00%
	Водорозчинний (B)	10.00%

Характеристики

Опис

Agroleaf[®] Liquid B-10 — це рідке добриво, насичене бором у формі етаноламіну бору. Використовується для запобігання або корекції змін, спричинених нестачею або дисбалансом у засвоєнні цього мікроелемента. Добриво можна вносити як листовим, так і кореневим способом для деревних та трав'янистих культур. Дефіцит бору - найбільш широко розповсюджена проблема нестачі мікроелемента у світі; це спричиняє серйозні втрати врожаю та падіння його якості. При нестачі бору в рослин гальмується вегетативний ріст та генеративний розвиток, погіршується ділення клітин, відмирає меристема та зменшується родючість. Але всього цього можна уникнути. Просто застосовуйте Agroleaf[®] Liquid B-10 та влаштуйте своїм рослинам борову ванну.

Переваги

- Усуває дефіцит бору
- Підходить для деревних та трав'янистих культур
- Листкове або кореневе внесення

Як користуватися

- 1 Для культур, які особливо чутливі до дефіциту бору, рекомендується превентивне кореневе або листкове підживлення, при якому вказана доза ділиться на 2 чи 3 порції.
- 2 У деревних культурах після цвітіння й зав'язування плодів рекомендуємо проводити превентивні внесення добрива у періоди збільшення кількості спалахів захворювань, а в орних культурах під час початкових фаз вегетативного росту.
- 3 У випадку дефіциту бору виконайте два чи три послідовних внесення В-10 із інтервалом у 15-20 днів; за потреби також продовжуйте вносити добриво корневим способом.
- 4 Зберігайте в сухому місці.
- 5 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
- 6 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.



Дози внесення

Культури:	Методи внесення:
Оливки:	Удобрювати слід за 30 днів до цвітіння та у фазі затвердіння кісточки дозою 150-300 куб. см./гкл із загальним об'ємом внесення 800-1000 л/га.
Цитрусові й плодові дерева:	Вносити добриво перед цвітінням, облітанням пелюсток та утворенням плодів дозою 150-300 куб. см./гкл.
Овочі	Внести 150-300 куб. см./гкл за 15 днів до початку цвітіння.

Випробуйте добриво на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.