



Max 44-0-0

 氮：将您的作物变成宝石

44		0		0	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O	

描述

Agrocote®Max 44-0-0能够为您的作物提供丰富的氮元素，帮助其生长。它适合中短期作物，如十字花科作物、马铃薯和叶菜类作物。在栽种或播种前只需施用一次，特别是在轻质土壤中，就可以轻松满足作物的高氮需求。采用了ICL（以化集团）先进的专利E-Max控释技术，能够在平均土壤温度为21°C的情况下，在1-2个月内为作物控释高品质酰胺态氮。

成分分析

氧化物

N	总氮	44%
	酰胺态氮(N-Urea)	44%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	0%
K ₂ O	氧化钾	0%

优势

- 通过减少淋失、挥发和脱氮等方式减少营养损失
- 提高作物产量，或在营养元素施用量较低的情况下保持产量
- 提高氮元素利用效率



施用率

作物：	用量（千克/亩）
马铃薯（包括种薯）	每亩施用10-26.67千克
水果和露天蔬菜类作物：	每亩施用10-26.67千克

如果使用量、施用方法或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。适用于中短期作物。

使用方法

- 1 可通过条施或撒施方式施用本产品。
- 2 不要超过在栽种前1-2周施用本产品。
- 3 请将本产品施入土壤5-10厘米处。
- 4 如有必要，可将本产品施于滴头下方。
- 5 栽种/播种后灌溉施用，以提高作物的品质和产量。
- 6 如果在作物后期使用水溶性肥料，请相应减少本产品的施用量。
- 7 密封好已开封或破损的肥料袋。
- 8 请保持储存环境干燥。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agrocote-max-44-0-0/>
: 17/05/2024

以化种植方案

